




## Cornus controversa 'Variegata'



<b>Höhe</b>	5-7 (10) m
<b>Breite</b>	5-7m
<b>Krone</b>	rund, etagenförmige Verzweigung, halboffene Krone, malerisch wachsend
<b>RINDE UND ÄSTEN</b>	grünbraun mit flachen Furchen
<b>Blatt</b>	breit eiförmig bis breit oval, 8-15 cm, weißgerändert
<b>Blüte</b>	cremeweiß, in schirmförmigen Dolden 15 cm, Mai/Juni
<b>Früchte</b>	kleine dunkelblaue Beeren
<b>Stacheln und Dornen</b>	keiner
<b>Toxizität</b>	nicht giftig (in der Regel)
<b>Bodenart</b>	alle, sofern gut drainiert, kein trockener Sandboden
<b>Bepflasterung</b>	verträgt keine Bepflasterung
<b>Winterhärte</b>	6b (-20,5 bis -17,8 °C)
<b>Windbeständig</b>	gut
<b>Andere Widerstände</b>	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut
<b>Faunabaum</b>	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut, Nährbaum für Vögel
<b>Verwendung</b>	kübel, kleine gärten, innenhof gärten
<b>Form</b>	mehrstämmige Baum
<b>Ursprung</b>	Veitch Nurseries, Großbritannien, vor 1890

Kleiner Baum, dessen waagerechte Verästelung mit in Etagen übereinander angeordneten Ästen eine auffällige Gestalt formt. Die Krone wird schließlich genauso breit wie hoch. Die jungen Zweige färben sich von grün zu grünbraun. Die abwechselnd platzierten Blätter haben eine ungleichmäßige Form, und die silberweißen Ränder verleihen dem Baum einen besonderen Zierwert. Die jungen Blätter sind etwas rosafarbig. Den großen schirmförmigen Blütenrispen folgen möglicherweise kleine dunkelblaue Beeren. Die Fruchtbildung ist jedoch sehr schwankend und nicht in allen Regionen garantiert. Wurzelt oberflächlich mit einem feinen Wurzelsystem. Aufgrund des früh einsetzenden Saftstroms muss der Schnitt im Sommer oder Herbst stattfinden.