



## Tilia americana 'Neglect'



<b>Höhe</b>	25-30 m
<b>Breite</b>	15-20m
<b>Krone</b>	eiförmig bis breit eiförmig, halboffene Krone
<b>RINDE UND ÄSTEN</b>	Zweige olivgrün, Rinde braungrau, leicht gefurcht
<b>Blatt</b>	breit eiförmig mit herzförmiger Basis, zugespitzt, dunkelgrün, 15-22 cm
<b>Blüte</b>	in hängenden Dolden, hellgelb, Juli
<b>Früchte</b>	rund, Ø ca. 0,9 cm, kurzfilzig behaart
<b>Stacheln und Dornen</b>	keiner
<b>Toxizität</b>	nicht giftig (in der Regel)
<b>Bodenart</b>	wenig anspruchsvoll, nicht zu trockener Boden
<b>Bepflasterung</b>	verträgt Teilbepflasterung
<b>Winterhärte</b>	5b (-26,0 bis -23,4 °C)
<b>Windbeständig</b>	gut
<b>Andere Widerstände</b>	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut
<b>Faunabaum</b>	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut, wertvoller Baum für Schmetterlinge und Falter
<b>Verwendung</b>	alleen und breite straßen, industriegebiete
<b>Form</b>	Hochstamm, Stammbusch
<b>Ursprung</b>	Van den Berk Boomkwekerijen, Sint-Oedenrode, Niederlande, ca. 1990
<b>Synonyme</b>	Tilia neglecta

Großer Baum mit eiförmiger bis breit eiförmiger Krone, der *T. americana* etwas ähnelt. Die anmutig geformten, breit eiförmigen Blätter haben eine herzförmige Basis, die mitunter etwas schief ist. Die Blätter sind mit einer Länge von 15 bis 22 cm auffällig groß. Beim Austreiben sind die Blätter etwas bronzefarben gefärbt. Die ausgewachsenen Blätter sind auf der Oberseite glänzend dunkelgrün. Auf der Unterseite sind sie etwas heller mit kleinen, hellbraunen Haarbüscheln in den Aderachsen. Im Juli bilden sich duftende, sahnefarbene Blüten in hängenden Dolden. Ihnen folgen kurzfilzig behaarte runde Früchte. Wurde von Van den Berk als *T. neglecta* in Kultur genommen. Diese Bezeichnung stellte sich als Synonym für *T. americana* heraus, obwohl der Baum von dieser Sorte abweicht. Deshalb wurde beschlossen, dem Baum einen neuen Sortennamen zu geben: *Tilia americana* 'Neglect'.