



Acer x zoeschense 'Annae'



Höhe	8 - 10 m
Breite	6-8m
Krone	rund kugelförmig , halboffene Krone
RINDE UND ÄSTEN	Rinde graubraun, junge Zweige rot
Blatt	3/5-lappig, dunkelgrün, 5 - 8 cm
Herbstfärbung	Orange, Rot
Blüte	gelbgrüne Blütenrispen, Mai
Früchte	behaart, aufrecht stehende Flügel, 3 - 5 cm
Stacheln und Dornen	keiner
Toxizität	nicht giftig (in der Regel)
Bodenart	alle Bodenarten
Bepflasterung	verträgt Teilbepflasterung
Winterhärte	6a (-23,3 bis -20,6 °C)
Windbeständig	gut
Andere Widerstände	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut
Faunabaum	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut, wertvoller Baum für Schmetterlinge und Falter
Verwendung	kübel, dachgärten, industriegebiete
Form	Hochstamm, mehrstämmige Baum
Ursprung	Schwerin, Deutschland, 1908

Dieser mittelgroße Baum ist eine Hybride zwischen *A. campestre* und *A. cappadocicum* subs. *lobelii*. *A. zoeschense* 'Annae' hat eine offene, ziemlich kugelförmige Krone. Der Baum hat einen regelmäßigen, etagenförmigen Habitus und kann eine Höhe von circa 10 m erreichen. Die jungen und schlanken Zweige, die genug Sonnenlicht kriegen, verfärben sich auffallend rotbraun. Ältere Äste haben eine graubraune Farbe. *A. zoeschense* 'Annae' bildet keinen Kork auf den Ästen. Das etwas der *A. campestre* gleichende Blatt schlägt dunkelviolettlila aus und verfärbt sich langsam dunkelgrün. Der Blattrand ist etwas welliger als bei *A. campestre* und das Blatt ist etwas größer. Wichtiges Zierelement ist die Herbstverfärbung des glänzend dunkelgrünen Blattes in allerlei roten und orangen Tönen. An einer sonnigen Stelle geht er meist besser auf. Feines Wurzelwachstum an der Oberfläche. Gut beständig gegen Luftverschmutzung und unempfindlich gegen Krankheiten und Plagen.