




Acer palmatum 'Bloodgood'



Höhe	8-10 (12) m
Breite	8-10m
Krone	breit eiförmig bis verkehrt eiförmig, dichte Krone, malerisch wachsend
RINDE UND ÄSTEN	glatt, graubraun
Blatt	handteilig mit 5-7 Blattlappen, schwarzrot
Herbstfärbung	Rot
Blüte	Blütenrispen rot, Mai
Früchte	einsamig, geflügelt, immer in Paaren, rot
Stacheln und Dornen	keiner
Toxizität	nicht giftig (in der Regel)
Bodenart	alle, aber nicht lehmhaltige oder zu trockene Böden
Bepflasterung	verträgt keine Bepflasterung
Winterhärte	6 (-23,3 bis -17,8 °C)
Windbeständig	mäßig
Andere Widerstände	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6)
Verwendung	kübel, dachgärten, kleine gärten, innenhof gärten
Form	Hochstamm, mehrstämmige Baum
Ursprung	Bloodgood Nurseries, New York, NJ, USA, vor 1940

Wunderschöner großer Strauch, der zu einem kleinen Baum heranwächst und in Ausnahmefällen über 10 m hoch werden kann. 'Bloodgood' entstand als Sämling von 'Atropurpureum', unterscheidet sich aber deutlich von diesem. So ist die Krone bedeutend schmäler und seine Blätter während des gesamten Sommers schwarzrot. Im Herbst färben sie sich wunderschön tiefrot. Auch die Früchte sind äußerst rot. 'Bloodgood' wird nicht nur durch Pfropfen vermehrt, sondern er kann auch gut aus Stecklingen gezogen werden. Durch Stecklinge vermehrte Pflanzen wachsen jedoch langsamer als gepfropfte Exemplare. Obwohl von der amerikanischen Baumschule Bloodgood Nurseries bezeichnet, wird manchmal suggeriert, dass 'Bloodgood' von der Baumschule Ebbinge & Van Groos in Boskoop entdeckt und nach Amerika exportiert wurde.