



## Cornus kousa



<b>Höhe</b>	4 - 8 m
<b>Breite</b>	4-8m
<b>Krone</b>	breit vasenförmig bis rund, halboffene Krone, malerisch wachsend
<b>RINDE UND ÄSTEN</b>	grau, später etwas abblättern
<b>Blatt</b>	eiförmig bis oval, dunkelgrün, 5 - 9 cm
<b>Herbstfärbung</b>	Gelb, Orange, Rot
<b>Blüte</b>	grüngelb in Köpfchen, Deckblätter weiß, Mai/Juni
<b>Früchte</b>	erdbeerartige, zusammengewachsene Steinfrucht, rot
<b>Stacheln und Dornen</b>	keiner
<b>Toxizität</b>	nicht giftig (in der Regel)
<b>Bodenart</b>	gut entwässerte Böden
<b>Bepflasterung</b>	verträgt keine Bepflasterung
<b>Winterhärte</b>	6b (-20,5 bis -17,8 °C)
<b>Windbeständig</b>	gut
<b>Andere Widerstände</b>	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut
<b>Faunabaum</b>	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut, Nährbaum für Vögel
<b>Verwendung</b>	kübel, dachgärten, kleine gärten, innenhof gärten
<b>Form</b>	Hochstamm, Stammbusch, mehrstämmige Baum
<b>Ursprung</b>	Japan, Korea und Zentralchina
<b>Synonyme</b>	Benthamia japonica

Vom Strauch zu einem mehrstämmigen Baum auswachsend. Kommt in der Natur in Bergwäldern in China, Japan und Korea vor. Kronenbreite circa 4 - 5 m. Wächst besonders in höherem Alter langsam. Das Blatt ist dunkelgrün und leicht wellig. Die Unterseite ist blaugrün und leicht behaart und die Herbstfarbe setzt sich aus gelben und scharlachroten Tönen zusammen. Jedes Köpfchen mit unauffälligen Blüten wird von 4 circa 8 cm großen Bracteen (Deckblättern) umgeben, die cremeweiß bis hellweiß sind. In voller Blüte besonders dekorativ. Die roten erdbeerartigen Früchte haben einen Durchmesser von circa 2 cm und haben circa 4 cm lange, rote Stiele. Die Pflanze wurzelt oberflächlich mit einem feinen Wurzelsystem. Benötigt humusreichen Boden. Ist beständiger gegen Trockenheit und ist etwas stärker als C. florida. In kultiviertem Anbau gibt es diverse gute Sorten, meist selektiert aus der Unterart Chinensis.